


JAM

Journal Algérien de Médecine
Algerian Journal of Medicine

المجلة الجزائرية للطب



FACULTE
DE MEDECINE
UNIVERSITE 3
CONSTANTINE

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelhamid ABERKANE

REDACTION

Redacteur en chef

Kaddour BENLABED

Rédacteurs en chef adjoints

Abdellatif BEN MATI

Comité de Rédaction

Mouloud ABDOU

Azzedine BELHADJ-MOSTEFA

Mounira BENCHAOUI

Zahia BOUDERDA

C. Corinne DAHEL

Sihem-Amina HAMMA

Foudil KHELIFA

Nadia FERDI

COMITE SCIENTIFIQUE

BEKADJA M.A. Oran

BENALI K.R. Annaba

BOLEN C. Belgique

BENYAOU R. France

BOUGUESSA N. Alger

BOUYOUCHEF S.E. Alger

COLIN C. Montreal. Canada

COLONNA P. France

ESSOUCI S. Tunisie

GUIDOUM Y. Constantine(*)

HAMDI CHERIF M. Setif

MANTZ JP. Strasbourg

SAUDER P. Strasbourg France

SOSSO M. Yaounde. Cameroun

NEZZAL L. Constantine

TOURE M. Dakar. Senegal

ZENATI A. Alger

HALIMI JM. France

FACULTE DE MEDECINE

UNIVERSITE CONSTANTINE 3

SALAH BOUBNIDER

(*): Décédé.

Le Journal Algérien de Médecine est publié bimestriellement à l'intention de ses lecteurs comme un forum de présentation des résultats de recherches et d'idées nouvelles.

Tous les écrits présentés ne reflètent que le point de vue des auteurs et non celui de la rédaction du journal. C'est pourquoi, le JAM n'est pas responsable des affirmations, suggestions ou déductions faites par l'auteur d'un article.

ISSN : 1111 - 1046

E-ISSN : 2710 - 866X



المجلة الجزائرية للطب

Journal Algérien de Médecine

Sommaire

Vol XXXIV, N°2 Avril/Juin 2026

ARTICLES ORIGINAUX

ACCROISSEMENTS GINGIVAUX ASSOCIES AUX PARODONTITES : Profil épidémiologique.
MACHOU F.

32

REVUE DE LA LITTERATURE

ACUPUNCTURE ET REFLEXE NAUSEEUX EN PROTHESE DENTAIRE : PERSPECTIVES D'UNE ALTERNATIVE THERAPEUTIQUE NON PHARMACOLOGIQUE :
revue de la littérature.

BENHASNA N. & al.

37

OSTEONECROSE DES MAXILLAIRES LIEE AUX MEDICAMENTS (MRONJ) : à propos d'un cas clinique et revue de la littérature.
YKHLEF S. & al.

41

CAS CLINIQUE

PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE D'UNE FISTULE ORO-ANTRALE CHRONIQUE CHEZ UN PATIENT GERIATRIQUE PAR LAMBEAU PERIOSTE PALATIN PEDICULE :
à propos d'un cas clinique.

BENGHERSALLAH D. & al.

46

PRISE EN CHARGE D'UNE CANINE MAXILLAIRE INCLUSE PAR IMPLANT DENTAIRE.

SAAD SAOUD R. & al.

51

CHERS LECTEURS

Dans ce numéro 2 du JAM (mis en ligne) sous le thème de la Médecine Dentaire, vous allez trouver cinq (05) articles.

** Un Article Original :*

- C'est une étude descriptive transversale, qui a été menée au sein de l'Unité de Parodontologie du Service de Chirurgie Dentaire de Sidi Bel Abbès, auprès de 682 patients présentant un accroissement gingival, afin d'étudier le profil épidémiologique de ces accroissements liés aux parodontites, diagnostiquées selon la classification de Chicago, suivant les stades et les grades.

** Deux Revues de la Littérature :*

- Cette revue première narrative vise à présenter l'évolution des connaissances scientifiques sur Le réflexe nauséeux représente un obstacle fréquent en prothèse dentaire, en suivant une progression chronologique des travaux publiés. Les premières études ont démontré l'efficacité de l'acupuncture traditionnelle sur des points précis tels que PC-6 et CV-24, en réduisant significativement la sévérité du réflexe, avec des recherches récentes de la littérature.

- La deuxième revue de la littérature, concerne l'ostéonécrose des maxillaires liée aux médicaments (MRONJ) qui constitue une complication sévère et invalidante associée aux traitements anti-résorptifs tels que les bisphosphonates. Son incidence, bien que faible, a un impact majeur sur la qualité de vie des patients. Nous rapportons le cas d'une patiente suivie pour un cancer du sein métastatique, traitée par bisphosphonates dans un contexte oncologique, qui a développé une ostéonécrose mandibulaire compliquée par une cellulite récidivante et une fistule cutanée.

** Deux cas cliniques:*

- L'un rapporte le cas d'un patient âgé de 75 ans, présentant une FOA chronique de 1,34 cm, survenue 30 mois après l'extraction de la dent 16 et compliquée d'une sinusite maxillaire chronique d'origine dentaire. Après contrôle médical et endoscopique de l'infection sinusale, la fermeture chirurgicale a été réalisée à l'aide d'un lambeau périosté palatin pédiculé.

- Le deuxième cas, c'est la prise en charge des canines incluses supérieures qui offre diverses options, allant des traitements orthodontiques sous leurs différentes formes à la conservation de la dent dans sa position d'inclusion et son remplacement par un implant dentaire.

BONNE LECTURE.